

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2022. augusztus 4.)

Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére

SZŐLŐ




A Térségben nem esett változást indukáló mértékű csapadék, csak helyenként 1-3 mm mennyiségű zápor. A régóta tartó csapadékszegény időjárás hatására a szőlőn is markánsan kezdenek látszani az aszály jelei. A rovarok közül a **darazsak** és a **hangyák** a vízhiány miatt szétrágják a bogyókat, kártételükkel sok szemet felsértenek. További probléma, hogy alig van új levélképződés a szárazságban, a termés viszont sok helyen nagy mennyiségű. A két ellentétes dolog kényszerítés, töppedést hozhat. Több termelő kénytelen öntözni a fiatal oltványokat, megelőzve azok kiszáradását. A **lisztharmat** számára már csak a fejlődésben elmaradott bogyók és a fiatal lomb jöhetnek szóba mint károsítható felület, de ez, a jelentős asszimilációs felület veszteség miatt, főleg ilyen aszályban, kihatással lehet a zsendülő fürtökre is. A túlterhelt tőkéken ebben az időszakban gyakoriak a **tőkeelhalás** (Eutypa, Stereum) tünetei. A terhelés csökkentésével, lombtrágyák folyamatos használatával megelőzhető a betegség fellépése. A tőke szakszerű, az első tünetek megjelenésekor elvégzett, visszavágásával újra nevelhetjük a növényt. A **szőlőmolyok** károsítása folyamatos. Vizsgáljuk át a fürtöket, és ahol szövedéket vagy lárvára utaló rágást észlelünk, ott haladéktalanul permetezzünk. Folyamatos a második nemzedék lepkéinek rajzása. Szex-feromon csapdáink a héten átlagosan 11 db lepkét fogtak. A szőlőben a **gyomnövényekre** is fordítsunk kellő figyelmet. Ha az ültetvény mostanra kigyomosodott, a nyári kezelést glifozát tartalmú készítménnyel végezzük el. Több veszélyes gyom is újra „nekilendül” ebben az időszakban, ezért ezek irtására akkor kerüljön sor, amikor még 20-30 cm-nél nem nagyobbak. Később csak sok veszéllyel, többszöri kaszálás és az ezt követő újrarahajtáskor elvégzett gyomirtás ad csak eredményt. A törzstisztításra fokozottan figyeljünk a glifozát tartalmú készítmények használatánál. A törzsön hagyott hajtásokon keresztül felszívódhatnak az ilyen hatóanyagú készítmények és a későbbiekben kárt okozhatnak a szőlőtőkéknek. Tartsuk **parlagfűmentesen** az ültetvényeket és környékét. A **gubacsatkák** kártétele továbbra is szembetűnő lehet egyes ültetvényekben. Ezekben a helyeken speciális atkaölő szerekkel védekezve egész évre megoldhatjuk a problémát. Több helyen, főleg a fehér fajtákon megjelentek a **klorózis** tünetei. A vashiányt a talaj levegőtlensége, a túlzottan meszes talaj, a gyors növekedés is elősegítheti. Lombtrágyák (Fitohorm 55 Fe, CsóppMix KáliVas) használatával vagy a talaj levegőtlenségének, tömörödöttségének megszüntetésével tudjuk javítani a rossz vasellátást. A Térségben az amerikai szőlőkabóca imágóinak (kifejlett egyedek) kártétele folyamatos. A rendkívül veszélyes FD terjedése megakadályozható az amerikai szőlőkabóca elleni eredményes védekezéssel. Azokban a termő ültetvényekben, amelyekben az előző tenyészidőben kimutatták az **amerikai szőlőkabóca** jelenlétét, kifejezetten ajánlott a károsító ellen védekezni a nagyobb fertőzésveszély miatt. A szaporítóanyag előállító területeken (törzsuültetvények és faiskolák) a vektor elleni védekezés kötelező, függetlenül attól, hogy előfordul-e a kabóca a területen vagy sem. A védekezésre több – a szőlőmolyok ellen is engedélyezett – rovarölő szer alkalmazható (pl. lambda-cihalotrin hatóanyagú permetező szerek).

A meteorológiai állomások által mért adatok

július 29- augusztus 4.	Heti átlaghőmérséklet (°C)	Csapadékösszeg (mm)
Lőrinci	24,3	3
Monor	24,4	2
Cegléd	24,2	1

Nagykőrös	24,4	0
Kecel	24,5	0

Pénteken napos idő lesz, fülledt hőséggel. Szombaton egy hullámzó hidegfront első hulláma érheti el térségünket. Növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de egyelőre az a legvalószínűbb, hogy napos idő és fülledt hőség lesz jellemző, majd egyre erősödő É-i széllel érkezhetsz frissebb levegő, illetve szórványosan zivatargócok pattanhatnak ki. Vasárnapra kis mértékben mérséklődik a nagy meleg, de ezzel együtt is 35 fok köré várható a napi maximum. Napközben napos-gomolyfelhős időben mérséklődik, majd este ismét feltámad a szél. Este, éjjel, elszórtan záporok, heves zivatargócok alakulhatnak ki. Hétfőn, kedden – egyelőre jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de – a térségben hullámzó, még nem jól előrejelezhető mozgású, viselkedésű front hatására labilis, zivatarok kialakulásához kedvező légköri helyzet várható a térségben. A csapadék eloszlásától függően maradhat a fülledt meleg, illetve eshet vissza a hőmérséklet, viszonylag kis körzeten belül nagy eltérést is eredményezve. Növényvédelmi munkákat a héten biztonságosan lehet végezni. A következő 7 napban a Térségben 6 mm csapadék várható (Forrás: <http://www.eumet.hu/>).

	<p>ajánlata erre a hétre atkák ellen: Thiovit Jet, Vertimec Pro molyok ellen: Karate Zeon 5 CS, Voliam, Affirm kabócák ellen: Karate Zeon 5 CS lisztharmat ellen: Dynali, Topas 100 EC, Thiovit Jet peronoszpóra ellen: Orondis Ultra csomag, Pergado F lisztharmat, peronoszpóra, szürkepenész ellen: Quadris Max gyomok ellen: Medallon Prémium</p>
---	--




A darazsak sok kárt okoznak



A fehér szőlők gyorsan érnek



A fiatal oltványok helyzete sok helyen kritikus



A Kardinál egyenetlenül érik, általában tíz bogyóból 4 rovarkáros



A nagyobb terhelés miatt nincs új hajtás képződés



A zsendülés egyenetlen



Gyakori a súlyos napégés